PERSPECTIVAS EM ONCOLOGIA **VII**

Cancro do pulmão:
perspectivas actuais em doentes com
mutação *EGFR*

www.heldernovaisbastos.pt

PATROCÍNIO INSTITUCIONAL

U. PORTO
FMUP FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DO PORTO

IPATIMUP
Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto

SERVIÇO ONCOLOGIA MÉDICA
SERVIÇO HEMATOLOGIA CLÍNICA

SÃO JOÃO

Questões para discutirmos hoje

- *EGFR*, como exemplo da personalização do tratamento no cancro do pulmão?
- Qual o impacto do estudo molecular do cancro do pulmão na vida real?
- Quais os principais mecanismos de resistência adquirida aos EGFR-TKIs, como prevenir e/ou tratar?
- Qual a melhor sequência de tratamento em mutados *EGFR*?

O caminho para a medicina personalizada: o caso do *EGFR*

Gefitinib = Placebo

Giaccone, et al. J Clin Oncol 2004

Gefitinib melhor que QT convencional se EGFR+ (aprovado com esta indicação)

Mok, et al. NEJM 2009

Afatinib e Gefitinib com PFS idênticas, mas com duração de resposta favorecendo Afatinib

LUX-Lung 7 (Ann Oncol 2015)

Dacomitinib melhor que Gefitinib

ARCHER 1050 (Lancet Oncol 2017)

O caminho para a cronificação do cancro de pulmão

Tratamento de doente EGFR+ em 2008:

Tratamento de doente EGFR+ em 2019:

Resultados de *next-generation sequencing* CHSJ Jan 2017-Jun 2018 (n=165 ADC III-IV)

O conhecimento de mutação *EGFR* tem real impacto clínico

CHSJ Jan 2017-Jun 2018 (n=165 ADC estádios III-IV)

Mecanismos de resistência adquirida aos EGFR-TKI 1ª/2ª geração

Osimertinib: EGFR-TKI 3ª geração

AURA3

EGFR TKI 1ª geração

419 patients with T790M+ advanced NSCLC

(vs Platino/Pemetrexed)

Osimertinib (2ªL)

Progressão/
Suspensão

FLAURA (vs EGFR TKI 1ªg)

Osimertinib (1ªL)

556 patients with previously untreated, EGFR+ (ex19del/L858R) advanced NSCLC

Progressão/
Suspensão

Plasma (ctDNA) de doentes com mutEGFR L858R / ex19del e/ou T790M

Mok et al. NEJM 2016

Soria et al. NEJM 2018

Mecanismos de resistência a Osimertinib

Osimertinib	AURA3 (2ªL) N=83	FLAURA (1ªL) N=91
% perda T790M	49	(N/A)
Alterações genéticas adquiridas (%)		
EGFR mut	21	9
MET amp	19	15
HER2 amp	5	2
PIK3CA mut	1	7
BRAF mut	3	3
KRAS mut		3
Rearranjos	3	1
Outros	52	60

AURA3 (Osimertinib 2ª linha)

- 49% com **perda de T790M (pior prognóstico)**, 6x mais frequente em doentes com ex19del (vs L858R)
- Mutações secundárias no EGFR em 21% dos doentes, sobretudo **C797S** (14%)
 - Mutações secundárias C797S foram 2x mais frequentes em doentes com L858R (vs ex19del)
 - Todos mantinham T790M à progressão
- **Amplificação MET** em 19% dos casos, em 43% dos quais com perda de T790M

FLAURA (Osimertinib 1ª linha)

- Sem evidência de mutação adquirida *EGFR* T790M
- O mecanismo de resistência mais comum foi **amplificação do MET**
- 14% doentes tinham ≥ 2 mutações de resistência concomitantes

Como prevenir ou tratar resistência adquirida ao Osimertinib?

Combinação Osimertinib + Afatinib/Erlotinib/Gefitinib

Acquired EGFR mutations with osimertinib (AURA3)
(represents 21% of total patients)

Contudo, a maioria das mutações secundárias de resistência ocorrem em *cis* com T790M

Van Kempen, et al. J Thorac Oncol. 2018

Combinação Afatinib + Ac EGFR	ORR em T790M+
Afatinib+Cetuximab (fase Ib)	32%
Afatinib+Nimotuzumab (fase Ib/II)	18%

Bennouna, J. Future Oncology. 2017

Como prevenir ou tratar resistência adquirida ao Osimertinib?

Combinção Osimertinib + Afatinib/Erlotinib/Gefitinib

Combinção Osimertinib + Crizotinib (ou Savolitinib, Capmatinib, Tepotinib)

Combinção Osimertinib + Trastuzumab emtansine/ Afatinib

Combinção Osimertinib + Trametinib/Selumetinib

Proliferação | Sobrevivência | Diferenciação | Polaridade | Adesão | Migração

Rudin. ESMO 2018
Arbour and Riely. Cancer 2018
Tang and Lu. Cancer Letters 2018

Qual a melhor sequência de tratamento em mutados *EGFR*?

TKI	Ensaio	PFS mediana (meses)	Ref.
Gefitinib	WJTOG3405, NEJ002, LUX-Lung 7, ARCHER 1050	9.2–10.9	Maemondo et al. NEJM 2010; Mitsudomi et al. Lancet Oncol 2010; Park et al. Lancet Oncol 2016; Wu et al. Lancet Oncol. 2017
Erlotinib	EURTAC, OPTIMAL, NEJ026	10.4–13.3	Zhou et al. Lancet Oncol 2011; Rosell et al. Lancet Oncol 2012; Furuya et al. ASCO 2018
Afatinib	LUX-Lung 3, LUX-Lung 6, LUX-Lung 7	11.0–11.1	Sequist et al. JCO 2013; Wu et al. Lancet Oncol 2014; Park et al. Lancet Oncol 2016
Dacomitinib	ARCHER 1050	<u>14.7</u>	Wu et al. Lancet Oncol. 2017
Erlotinib + Bevacizumab	NEJ026	<u>16.9</u>	Furuya et al. ASCO 2018
Osimertinib (2ªL)	AURA3	10.1	Mok et al. NEJM 2017
Osimertinib (1ªL)	FLAURA	<u>18.9</u>	Soria et al. NEJM 2018

Qual a melhor sequência de tratamento em mutados *EGFR*?

OS 26.8 meses | Sobrevida aos 24 meses = 56% | Duração mediana de tratamento com Osimertinib 8.1 meses (AURA3)

Total number of events	63
2-year survival rate (maturity)	79% (50%)
2.5-year survival rate (maturity)	69% (37%)

Dados de OS ainda imaturos | PFS2 >24 meses | Sobrevida aos 18 meses = 83% (FLAURA)

Sequential treatment with afatinib and osimertinib in patients with *EGFR* mutation-positive non-small-cell lung cancer: an observational study

Maximilian J Hochmair^{*1}, Alessandro Morabito², Desiree Hao³, Cheng-Ta Yang⁴, Ross A Soo⁵, James C-H Yang⁶, Rasim Gucalp⁷, Balazs Halmos⁷, Lara Wang⁸, Amanda Golembesky⁹, Angela Märten¹⁰ & Tanja Cufer¹¹

Hochmair et al. *Future Oncol.* 2018

TKI 2ª geração
Afatinib

TKI 3ª geração
Osimertinib

Tempo mediano tratamento 27.6 meses (39.3m se ex19del)
11.9 meses (Af) ----- 14.3 meses (Osi)

Notas:

- Estudo de vida real (15.3% doentes com ECOG PS $\geq$ 2)
- Sobrevida global aos 2 anos foi de 78.9%

Afatinib em 1ª linha:

- Muito eficaz nas *EGFR* ex19del (OS 31-33 meses, [LUX-Lung 3, 6 e 7] e ORR 75% [LUX-Lung 7])
- Nos ensaios LUX-Lung: (a) somente 6% dos doentes faleceram durante Afatinib 1ª linha; (b) 71-80% fizeram tratamentos subsequentes $\geq$ 2ª linha (~30% fizeram tratamento de 4ª linha)
- Doentes tratados com Afatinib têm taxa elevada de aquisição de T790M (75% dos ex19del, 1.5x maior do que em tumores L858R+)

Poderemos seleccionar melhor os doentes para terapêutica sequencial?

Tumor mutation burden (TMB)

	Resistência por T790M	Outro mecanismo de resistência
TMB mediano pré-tratamento	3.77 mutações/Mb	4.72 mutações/Mb

Offin et al. Clin Cancer Res 2019

TMB é menor em casos EGFR+ (vs casos WT)

Em casos EGFR+, TMB elevado associa-se a mau prognóstico

- TTD mais curto, $P = 0.006$
- OS mais curto, $P = 0.03$

Existem doentes em que seja claro o benefício de Osimertinib em 1ª linha?

TKI	PFS mediana (meses)	PFSm (meses) metástases SNC	Principais efeitos adversos (% grau ≥3)
Gefitinib	9–11	10	Toxicidade hepática (8%), rash (3%), diarreia (1%)
Erlotinib	10–13	11	Rash (13%), diarreia e fadiga (5%)
Afatinib	11	8	Diarreia (13%), rash (9%), Fadiga (6%), Estomatite (4%)
Osimertinib (2ªL)	10	8.5	Rash, diarreia, xerose cutânea, paroníquia (1-2%)
Osimertinib (1ªL)	<u>19</u>	<u>15</u>	

Portadores T790M

Qual o melhor tratamento após progressão com *EGFR*-TKIs?

Quimioterapia ± Antiangiogénico

- Platino+Pemetrexed: PFS 5m / OS ? (AURA3)
- Docetaxel+Nintedanib: PFS 4m / OS 13m (LUME-Lung 1)

Imunoterapia

- Nivolumab: PFS 2m / OS 12m (CM-017&057)
- Atezolizumab: PFS 3m / OS 14m (OAK)
- Pembrolizumab (PD-L1≥1%): PFS 4m / OS 15m (KN-010)

Combinação

- Atezo+Bevac+Carbo/Pacl:
PFS 8 m / OS 19.2 m (IMpower150)

Terapêutica-alvo?

NIH U.S. National Library of Medicine
ClinicalTrials.gov

905 estudios encontrados para:
EGFR | Lung Cancer

**KEEP
CALM**
cause this is just the
BEGINNING